

Hängt der Abfall des Nabelschnurrestes mit der Gewichtszunahme des Kindes zusammen?

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der

gesamten Medizin

verfasst und einer

hohen medizinischen Fakultät

der

kgl. bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Max Götzl,

approb. Arzt aus Ampermoosching.

MÜNCHEN, 1904.

Kgl. Hofbuchdruckerei Kastner & Callwey.

Hängt der Abfall des Nabelschnurrestes mit der Gewichtszunahme des Kindes zusammen?

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der

gesamten Medizin

verfasst und einer

hohen medizinischen Fakultät


der

kgl. bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Max Götzl,

approb. Arzt aus Ampermoching.



MÜNCHEN, 1904.

Kgl. Hofbuchdruckerei Kastner & Callwey.

Referent :

Herr Geheimrat Professor Dr. Franz v. Winckel.

*Meinem teuren Vater
und dem Andenken
meiner verstorbenen Mutter
in
Liebe und Dankbarkeit zugeeignet.*

Nachdem, dem Zeugnisse Quetelet's zufolge, *Chaussier* als der erste konstatiert hatte, dass die Kinder von ihrer Geburt an mit individueller Verschiedenheit für einige Tage an Gewicht abnehmen und hierauf in ein zweites Stadium der Zunahme eintreten, wurde bald der genauen Erörterung der hiemit aufgetauchten Frage über die Gewichtsveränderungen der Neugeborenen von mehreren Seiten die verdiente Aufmerksamkeit geschenkt. Wie wir weiter unten sehen werden, nehmen die Kinder gerade in den ersten Tagen ihres extrauterinen Lebens am meisten an Gewicht ab, erreichen am 3. oder 4. Tage meist ein Minimum ihres Gewichtes, worauf dann wieder ein allmähliches Zunehmen des Gewichtes stattfindet, so dass am 8. bis 16. Tage in der Mehrzahl der Fälle, wenn nicht krankhafte Verhältnisse ein bedingendes Moment für die fortbestehende Gewichtsabnahme liefern, das Gewicht, welches die Kinder bei der Geburt zeigten, wieder erreicht ist. So wurden denn verschiedene Wägungen unternommen, welche fast dieselben Resultate ergaben.

Was aber die Ursachen dieser Gewichtsveränderungen betrifft, so erfahren wir erst

Näheres nach den genauesten Untersuchungen von Winckel¹⁾ in der Berliner Universitäts-Frauenklinik und von E. Haake in Leipzig¹⁾. Beide gingen in ihren Beobachtungen von folgenden Gesichtspunkten aus:

1. Sämtliche Kinder wurden gleich nach der Geburt, nachdem sie gereinigt resp. gebadet waren, im nackten Zustande von ihnen selbst auf einer genauen Balkenwage gewogen, und diese Wägungen wurden jeden folgenden Tag zu einer ganz bestimmten Zeit und zwar 8—9 Uhr morgens wiederholt.

2. Nehmen beide Rücksicht auf das Geschlecht der Kinder, und fanden dabei, dass die Knaben im allgemeinen weniger abnehmen als die Mädchen.

3. Legen beide der Ernährungsweise (ob künstlich oder natürlich) grosse Bedeutung bei und teilen mit, dass die bloss mit Kuhmilch ernährten Kinder am 10. Tage post partum noch bedeutend leichter waren als gleich nach der Geburt, dass hingegen die durch Muttermilch ernährten schon am 3. oder 4. Tage eine Zunahme des Gewichtes im Vergleich zu dem des vorhergehenden Tages, aber nicht zum ursprünglichen Gewichte zeigten.

¹⁾ „Untersuchungen über Gewichtsverhältnisse bei 100 Neugeborenen in den ersten acht Tagen nach der Geburt,“ Verlag vom 11. März 1862. (Monatsschrift für Geburtskunde Band 19, p. 416.

²⁾ „Ueber Gewichtsveränderungen der Neugeborenen“ (Monatsschrift für Geburtskunde, Bd. 19, p. 339.

4. Mussten die Kinder ausgetragen und gesund sein. —

Hier sollen kurz die verschiedenen Momente, welche die Abnahme des Gewichtes in den ersten Tagen nach der Geburt bedingen, erwähnt werden. Der am nächsten liegende Grund besteht in der bald nach der Geburt erfolgenden Entleerung von Urin und besonders Meconium. Soll letzteres durchschnittlich 60 g betragen, so verlieren die Kinder schon durch den Abgang desselben 60 g.

Weiters kommt die nach der Geburt notwendig eintretende Veränderung der Ernährung in Betracht, die Arbeitsleistung durch Erwerben der Nahrung und durch Verdauen der erworbenen, was noch dazu durch die in den ersten Tagen nach der Geburt bestehende mangelhafte Funktion des Darmtrakts erschwert ist.

Dann kommt noch die Respiration und die nach der Geburt sehr vermehrte Hauttätigkeit als bedingendes Moment der Gewichtsabnahme dazu. Beeinflussend auf die vermehrte Sekretion ist die Entfernung der die Haut schützenden Fetthülle, der vernix caseosa, wodurch die Ausführungsgänge der oberflächlichen Schweissdrüsen blossgelegt werden, ferner die hohe Temperatur der Umgebung, Kleider, Bett der Mutter etc. Endlich ist noch die ungewohnte Tätigkeit des Saugens zu erwähnen, wodurch der Nahrungserwerb in den ersten Tagen sehr beschränkt ist.

In allen diesen Punkten, welche die Gewichtsabnahme bedingen, stimmen beide Autoren überein, nur in einem gehen die Ansichten beider auseinander. Winckel zieht nämlich aus

seinen Beobachtungen den Schluss, dass die Zeit der Ab- und Wiedertzunahme an Gewicht in der Regel mit dem Abfall des Nabelschnurrestes zusammenhänge, dass Neugeborene meist bis zum Abfall des Nabelschnurrestes ab- und gleich nach demselben wieder zunehmen. Nach einer von ihm aufgestellten Tabelle begannen von 115 Fällen

17 am Tage vor,

60 am gleichen Tage mit,

38 am Tage nach

dem Abfall des Nabelschnurrestes wieder zuzunehmen.

Dagegen begannen nach einer von Haake in Leipzig aufgestellten Tabelle von 96 Kindern 75 mit dem dritten Tage nach der Geburt an Körpergewicht zuzunehmen, während doch erst 21 den Rest der Nabelschnur verloren hatten, so dass schliesslich Haake behauptet, zwischen dem Prozess des Nabelabfallens und der Gewichtszunahme des Kinders existiert ein Zusammenhang bezüglich der Zeit nicht. Er hat dabei die Veränderungen des Nabelschnurrestes nicht in Erwägung gezogen. Nun behauptet von Winckel, dass erst mit dem Zeitpunkt, wo der Rest der Nabelschnur abfalle, die neuen Druckverhältnisse in der Leber geregelt seien, so dass nun erst die Leber in ihre Funktion als gallenabsonderndes Organ eintreten könne.

Dieser umstrittene Punkt wurde nun zwar in verschiedenen Arbeiten, so von Dr. Gregory, erwähnt, aber nie einer eingehenden Untersuchung unterzogen, weshalb ich auf Anregung des Herrn Geheimrats Franz von Winckel ihn

darzulegen unternommen habe. Die von mir zu diesem Zwecke aufgestellten, weiter unten folgenden Tabellen sollen gleichzeitig einen weiteren Beitrag zur Feststellung der Gewichtsveränderungen liefern.

Zur Lösung dieser Aufgabe habe ich in der kgl. Universitäts-Frauenklinik München in den Monaten Januar bis März 1904 erst 100 und später weitere 30 ausgetragene Kinder, deren Mütter gesund waren, so dass sie ihre Kinder selbst stillen konnten, am Tage, womöglich unmittelbar nach der Geburt, in nacktem Zustande, nur auf einem erwärmten und genau gewogenen Handtuche liegend, auf einer genau ziehenden Balkenwaage selbst gewogen, und diese Wägungen zweimal täglich, und zwar morgens zwischen 8 und 9 Uhr und abends zwischen 5 und 6 Uhr, acht Tage lang fortgesetzt. Dabei habe ich ganz besonders den Veränderungen des Nabelschnurrestes und Nabels Beachtung geschenkt. Soviel auch über Erkrankungen des Nabels, über die Art der Abnabelung u. s. w. geschrieben worden ist, so scheint mir doch nirgends darauf genügend hingewiesen zu sein, dass schon leichtere Infektionen des Nabels auf den Gesamtorganismus und die regelmässige Gewichtszunahme nicht ohne Einfluss sind. So habe ich bei 10 Fällen eine Gewichtszunahme erst einige Tage nach Abfall des Nabelschnurrestes gefunden, da krankhafte Veränderungen sie verzögerten, während ich bei 63 Fällen eine Gewichtszunahme vor Abfall des Nabelschnurrestes konstatieren kann, da der Nabelschnurrest bereits einen vollständigen

Vertrocknungsprozess durchgemacht und nur mehr an einem kleinen Rest hing, welcher sich in den Wintermonaten 1 bis $1\frac{1}{2}$ Tag später löst. Es waren dies nur Fälle, bei welchen der Nabelschnurrest derartige Veränderungen zeigte, dass man stündlich seinen Abfall erwarten konnte. Sicherlich möchte ich mir die Gewichtsschwankungen in den oben erwähnten 10 Fällen so erklären, dass die geringen Entzündungserscheinungen schon genügten, auf den so labilen kindlichen Organismus so zu wirken und die unter normalen Verhältnissen eintretende Gewichtszunahme zu verzögern und hintanzuhalten. Zieht man nun in Erwägung, dass das Gewicht zu steigen beginnt, sobald der Nabelschnurrest grössenteils trocken, wie ja aus der unten angeführten Tabelle zur Evidenz erwiesen, dass ferner bei Fällen, wo der Nabelschnurrest eiterte oder bloss nässte, das Gewicht des Kindes erst am 6. oder 7. Tage zu steigen begann, dass endlich bei einer grossen Anzahl von Fällen die Gewichtszunahme und der Abfall des Nabelschnurrestes zusammentrafen, so wird man mit Recht zu dem Schlusse kommen, es hänge die Zunahme des Gewichtes mit dem regulären Vertrocknungsprozess des Nabelschnurrestes zusammen. Aus den vorgenommenen Wägungen ist genau ersichtlich, dass die Gewichtszunahme bei

63 Fällen vor,

57 „ gleichzeitig mit oder $1\frac{1}{2}$ Tag differierend,

10 „ nach

Abfall des Nabelschnurrestes eintrat.

Wie ersichtlich, fiel der Nabelschnurrest

bei 23 Fällen am 4. Tage

„ 66 „ „ 5. „

„ 35 „ „ 6. „

„ 6 „ „ 7. „ ab.

Die Gewichtszunahme trat ein

bei 3 Fällen am 3. Tage

„ 69 „ „ 4. „

„ 43 „ „ 5. „

„ 14 „ „ 6. „

„ 1 „ „ 7. „

Zum Schlusse dieser Arbeit ist es mir eine angenehme Pflicht, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Geheimrat Professor Dr. Franz von Winckel, für die lebenswürdige Uebernahme des Referates, sowie für die Anregung und gütige Unterstützung bei der Arbeit meinen ergebensten Dank auszusprechen.

Lauf. Nummer	Gewicht der Kinder nach Tagen, morgens und abends								Beschaffenheit des Nabelschnurrestes	Tag, an welchem	
	Geburts- tag	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		der Nabelschnur- rest abfiel	das Gewicht wieder stieg
1	3572	3561	3396	3287	3210	3182	3204	3235	am 3. Tage ziemlich vertrocknet	6. m.	6. m.
		3483	3315	3220	3175	3210	3218				
2	3010	2946	2810	2726	2700	2743	2765	2770	4. Tag fast ver- trocknet	6. m.	5. a.
		2903	2754	2705	2724	2750	2792				
3	3600	3585	3440	3386	3580	3576	3491	3524	Beginn der Vertrock- nung am 3. Tage	5. m.	4. a.
		3513	3422	3355	3562	3570	3510				
4	4100	3935	3876	3720	3710	3765	3800	3892	am 3. Tage stark trok- ken; am 4. etwas entzündet	5. a.	6. m.
		3912	3835	3720	3707	3811	3875				
5	2900	2873	2786	2712	2720	2772	2791	2816	am 3. Tage beginnt die Vertrocknung	5. a.	4. a.
		2812	2742	2715	2735	2754	2805				
6	2685	2590	2516	2473	2481	2532	2581	2670	4. Tag Vertrocknung ziemlich vorge- schritten	5. m.	4. a.
		2544	2480	2450	2500	2570	2600				
7	3552	3480	3421	3310	3281	3330	3381	3390	3. Tag trocken; 4. Tag noch dünner Rest	5. m.	5. a.
		3432	3390	3285	3312	3372	3355				
8	3255	3230	3172	3120	3185	3244	3312	3315	3. Tag trocken; 4. Tag dünner Rest	6. m.	4. a.
		3195	3164	3182	3210	3270	3300				
9	3352	3310	3224	3186	3180	3192	3230	3244	3. Tag trocken; 4. Tag fast ganz vertrocknet	5. m.	5. m.
		3285	3205	3130	3165	3214	3226				
10	3370	3312	3223	3180	3210	3170	3254	3292	3.—5. Tag fast trocken	5. a.	5. m.
		3284	3316	3164	3254	3275	3246				

Lauf Nummer	Gewicht der Kinder nach Tagen morgens und abends								Beschaffenheit des Nabelschnurrestes	Tag, an welchem	
	Geburts- tag	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		der Nabelschnur- rest abfiel	das Gewicht wieder stieg
11	3620	3577	3526	3510	3522	3586	3590	3660	4. Tag trocken mit Ausnahme ein. Sulz- restes vorn unten.	6. m.	5. m.
		3532	3512	3492	3540	3600	3624				
12	3370	3322	3260	3260	3300	3342	3420	3475	3. — 4. Tag Vertrock- nungsprozess	5. m.	4. m.
		3284	3242	3254	3335	3405	3432				
13	3020	2965	2866	2812	2840	2882	2910	2935	3. Tag zur Hälfte vertrocknet; 4. Tag ein kleiner Rest	5. a.	4. a.
		2925	2830	2835	2832	2865	2945				
14	2925	2852	2720	2720	2772	2832	2900	2935	4. Tag noch d. Hälfte frisch, 5. Tag ver- trocknet	6. m.	4. m.
		2795	2684	2755	2794	2880	2926				
15	3650	3590	3572	3444	3472	3553	3581	3620	3. — 4. Tag ziemlich vertrocknet	5. m.	4. a.
		3580	3492	3445	3505	3535	3600				
16	2722	2680	2590	2493	2510	2612	2653	2690	3. Tag fast ver- trocknet	6. m.	4. a.
		2625	2522	2502	2570	2615	2675				
17	3650	3591	3556	3502	3472	3420	3492	3481	bis 4. Tag ziemlich nass, 5. Tag trocken	6. m.	6. m.
		3570	3510	3475	3415	3450	3475				
18	3500	3462	3381	3272	3291	3351	3382	3444	2. Tag merklich kleiner; 4. Tag trocken	5. m.	5. m.
		3410	3332	3250	3315	3410	3412				
19	3370	3326	3272	3181	3174	3175	3250	3315	3. Tag klein; 5. Tag kleiner Rest	6. m.	5. m.
		3284	3230	3120	3160	3214	3270				
20	3040	3012	2916	2872	2875	2824	2884	2922	3. Tag trocken	5. m.	4. m.
		2952	2820	2885	2872	2875	2910				

Lauf. Nummer	Gewicht der Kinder nach Tagen, morgens und abends								Beschaffenheit des Nabelschnurrestes	Tag, an welchem	
	Geburts- tag	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		Nabelschnur- rest abfiel	das Gewicht wieder stieg
21	3200	3144	3070	2984	2950	2970	3014	3020	3. Tag etw. nässend; 4. Tag trocken	6. m.	5. a.
		3120	3023	2962	2975	2982	3000				
22	2812	2784	2705	2616	2602	2682	2712	2735	3.—5. Tag Vertrock- nungsprozess	6. a.	5. a.
		2736	2650	2605	2644	2717	2715				
23	2900	2830	2785	2734	2685	2715	2786	2844	3. Tag nässend, 5. Tag trocken	6. m.	6. m.
		2812	2752	2716	2672	2738	2812				
24	3550	3512	3445	3372	3405	3475	3500	3516	2. Tag weicher; 4. Tag ganz trocken	5. m.	4. a.
		3484	3405	3390	3415	3442	3520				
25	2830	2802	2761	2720	2852	2845	2891	2912	2. Tag weicher; 3. Tag ein klein. R st	4. a.	4. a.
		2770	2735	2810	2860	2870	2905				
26	2880	2845	2785	2725	2692	2706	2770	2784	3. Tag nässend, 4. Tag trockener	5. m.	6. m.
		2812	2742	2704	2674	2722	2765				
27	3310	3294	3225	3173	3175	3225	3290	3285	3. Tag zieml. trock.; 5. Tag noch e. klein. nässender Rest	6. m.	4. a.
		3266	3200	3180	3210	3250	3305				
28	3432	3385	3270	3216	3261	3260	3284	3305	2. Tag erweicht; 3. Tag beginnt Ver- trocknung	5. m.	4. a.
		3352	3254	3235	3255	3273	3310				
29	3300	3284	3190	3151	3160	3234	3292	3320	3. Tag ziemlich ver- trocknet; 5. Tag kleiner Rest	6. m.	4. a.
		3251	3172	3170	3205	3250	3295				
30	3412	3390	3270	3235	3322	3412	3505	3602	3. Tag ziemlich ver- trocknet	5. m.	4. a.
		3345	3264	3315	3368	3445	3525				

Lauf. Nummer	Gewicht der Kinder nach Tagen, morgens und abends								Beschaffenheit des Nabelschnurrestes	Tag, an welchem	
	Geburts- tag	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		der Nabelschnur- rest abfiel	das Gewicht wieder stieg
31	3272	3245	3156	3092	3065	3150	3195	3224	2. Tag kleiner; 3.—5. Tag vertrocknet	5. a.	5. a.
		3200	3114	3088	3142	3176	3230				
32	3650	3621	3528	3432	3485	3555	3694	3626	3. Tag klein; 4. Tag fast ganz vertrockn.	5. m.	4. a.
		3576	3456	3470	3520	3581	3610				
33	3520	3478	3400	3336	3361	3412	3437	3454	2. Tag erweicht; 4. Tag noch ein kleiner Rest	5. a.	4. a.
		3416	3350	3374	3393	3405	3441				
34	3517	3490	3432	3390	3384	3400	3492	3505	3. Tag ziemlich ver- trockn.; 5. Tag noch ein kleiner Rest	7. m.	5. m.
		3453	3419	3372	3412	3471	3480				
35	3605	3574	3496	3427	3482	3500	3550	3581	3. bis 4. Tag ver- trocknet	5. m.	4. a.
		3521	3480	3436	3475	3524	3545				
36	3120	3104	3062	3025	3036	3064	3124	3202	3. bis 4. Tag ver- trocknet	5. m.	5. m.
		3090	3048	3015	3072	3112	3160				
37	3082	3024	2965	2932	2948	2966	3031	3046	3. Tag zieml. trock.; 4. Tag Nabel etwas gerötet	4. m.	5. m.
		2986	2940	2925	2970	3005	3020				
38	3360	3322	3251	3173	3190	3210	2256	3285	3. Tag vertrocknet	4. a.	4. a.
		3285	3237	3186	3202	3240	3264				
39	3010	2985	2934	2875	2812	2784	2805	2825	3. Tag beg. Vertrock- nung; 4. Tag nass. u. etwas entzündet	4. a.	6. a.
		2956	2896	2838	2796	2810	2816				
40	3620	3594	3548	3464	3562	3602	3654	3684	3. Tag vertrocknet; 4. Tag kleiner Rest	5. m.	4. a.
		3572	3477	3505	3580	3626	3671				

Lauf. Nummer	Gewicht der Kinder nach Tagen, morgens und abends								Beschaffenheit des Nabelschnurrestes	Tag, an welchem	
	Geburts- tag	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		Nabelschnur- rest abfiel	das Gewicht wieder stieg
41	3615	3574	3448	3444	3472	3491	3510	3525	4. Tag vorn unten kleiner Sulzrest	5. m.	4. m.
		3528	3426	3450	3466	3500	3514				
42	3060	3011	2926	2865	2900	2916	2955	3012	2. Tag erweicht; 4. Tag trocken	5. m.	4. a.
		2982	2915	2870	2905	2930	2987				
43	3230	3216	3125	3015	2985	2944	3002	3025	3. Tag zieml. trock.; 4. Tag Nabel ent- zündet	5. m.	6. a.
		3174	3090	3012	2963	2975	2996				
44	3750	3713	3674	3620	3614	3676	3751	3765	3. Tag beg. Vertrock- nung; Nabelschnur- rest sehr dick	6. m.	5. m.
		3695	3635	3608	3668	3720	3770				
45	3180	3162	3030	2976	2926	2904	2954	2970	4. Tag etwas eitrig; 5. Tag kleiner Rest	6. m.	6. a.
		3095	3016	2954	2912	2940	2935				
46	3362	3335	3227	3250	3245	3325	3391	3436	3. Tag zur Hälfte vertrocknet	5. m.	4. m.
		3290	3214	3276	3300	3356	3423				
47	4640	4617	4524	4450	4411	4486	4498	4525	3. bis 5. Tag ver- trocknet	5. m.	5. a.
		4553	4476	4422	4470	4482	4512				
48	3645	3610	3557	3470	3560	3644	3684	3716	3. Tag vertrocknet; 4. Tag kleiner Rest; ebenso 5. Tag	6. m.	4. a.
		3584	3495	3503	3592	3670	3700				
49	3350	3297	3215	3165	3195	3230	3245	3270	3. Tag blutet etwas; 4. Tag trocken	4. a.	5. m.
		3271	3186	3144	3210	3226	3250				
50	4320	4296	4226	4116	4126	4166	4176	4205	2. Tag erweicht; 4. Tag ganz trocken	5. m.	5. m.
		4273	4185	4105	4170	4182	4185				

Lauf. Nummer	Gewicht der Kinder nach Tagen, morgens und abends							Beschaffenheit des Nabelschnurrestes	Tag, an welchem	
	Geburts- tag	2.	3.	4.	5.	6.	7.		der Nabelschnur- rest abfiel	das Gewicht wieder stieg
51	3226	3200	3165	3065	3090	3153	3185	3196	3. Tag trocken	5. m. 5. m.
		3178	3099	3046	3126	3175	3205			
52	3650	3618	3572	3496	3453	3520	3560	3566	2. Tag weich aber gross; 4. Tag kleiner Rest	5. m. 5. a.
		3597	3520	3475	3480	3500	3571			
53	2960	2885	2802	2743	2694	2703	2736	2782	3. Tag zieml. trock.; 4. Tag Nabel ent- zündet	4. m. 6. m.
		2836	2790	2716	2681	2717	2755			
54	2690	2672	2578	2489	2473	2512	2565	2571	3. Tag trocken	4. m. 5. m.
		2615	2537	2446	2470	2534	2550			
55	2784	2730	2669	2600	2625	2632	2664	2680	2. Tag weich; 3.—4. Tag trocken	5. m. 5. m.
		2676	2617	2591	2640	2635	2672			
56	3382	3290	3185	3096	3117	3165	3192	3230	3. Tag trocken; 5. Tag kleiner Rest	6. a. 4. a.
		3210	3112	3105	3140	3165	3205			
57	4100	4075	3966	3941	3865	3896	3945	3956	3. bis 4. Tag trocken	5. m. 5. a.
		4012	3965	3873	3910	3924	3937			
58	3670	3582	3514	3505	3551	3592	3586	3600	2. Tag trock.; bleibt bis 6. Tag ein kleiner Rest	6. m. 4. m.
		3526	3492	3535	3550	3574	3591			
59	3280	3246	3175	3105	3216	3244	3252	3255	3. Tag trocken	5. m. 5. m.
		3222	3149	3192	3230	3220	3265			
60	2916	2875	2812	2742	2766	2770	2770	2812	2. bis 4. Tag trocken	5. m. 5. m.
		2844	2785	2735	2774	2762	2791			

Lauf. Nummer	Gewicht der Kinder nach Tagen, morgens und abends								Beschaffenheit des Nabelschnurrestes	Tag, an welchem	
	geburts- tag	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		der Nabelschnur- rest abfiel	das Gewicht wieder stieg
61	3532	3500	3465	3408	3460	3495	3534	3568	3. Tag trocken	4. a.	4. a.
		3486	3420	3415	3471	3514	3552				
62	3114	3078	3026	2971	2934	2967	2980	3022	3. Tag trocken; 4. Tag Nabel etwas gerötet	4. m.	5. m.
		3042	2996	2912	2945	2991	3005				
63	3680	3605	3575	3544	3595	3585	3592	3642	2. Tag weich; 3. Tag trocken	5. m.	4. m.
		3595	3532	3546	3574	3585	3606				
64	3440	3396	3310	3271	3287	3304	3340	3337	3. bis 4. Tag trocken	5. a.	4. a.
		3371	3285	3293	3296	3312	3322				
65	3806	3750	3710	3644	3605	3635	3640	3675	2. Tag klein; 4. Tag kleiner Rest	5. m.	5. a.
		3746	3670	3631	3626	3640	3662				
66	2882	2796	2730	2716	2800	2760	2795	2832	2. Tag ziemlich trocken	4. m.	4. m.
		2744	2702	2732	2800	2812	2805				
67	3226	3200	3090	3034	3124	3190	3215	3230	3. Tag klein; 5. Tag noch ein Rest	6. m.	4. a.
		3137	3048	3062	3156	3206	3226				
68	4600	4516	4435	4346	4390	4400	4370	4421	3. Tag klein; 4. Tag trocken	5. m.	4. a.
		4472	4405	4355	4415	4397	4416				
69	3087	3036	2965	2937	2976	3016	3040	3085	3. u. 4. Tag trocken	5. a.	4. m.
		2978	2912	2991	3005	3042	3067				
70	3456	3412	3346	3378	3381	3425	3516	3546	3. u. 4. Tag trocken	5. m.	4. m.
		3391	3312	3350	3394	3461	3552				

Lauf. Nummer	Gewicht der Kinder nach Tagen, morgens und abends								Beschaffenheit des Nabelschnurrestes	Tag, an welchem	
	Geburts- tag	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		der Nabelschnur- rest abfiel	das Gewicht wieder stieg
71	3000	2928	2818	2869	2971	3036	3118	3156	3. Tag klein; 4. u. 5. Tag trocken	6. m.	4. m.
72	3204	2876	2805	2934	3010	3070	3165	3040	2. Tag klein; 3. u. 4. Tag nässend; 5. Tag Nabel gerötet	5. m.	7. m.
		3179	3097	3028	2975	2950	2945				
73	2792	3123	3050	3006	2952	2938	2972	2746	2.—3. Tag noch ziem- lich frisch; 4. Tag trocken	6. m.	5. m.
		2736	2615	2583	2600	2695	2705				
74	3216	2658	2597	2570	2642	2712	2713	3076	3. u. 4. Tag nässend; 5. Tag etwas trocken	7. m.	6. m.
		3185	3126	3057	3017	3036	3070				
75	3182	3150	3094	3025	3005	3087	3062	3075	2. Tag klein; 3. u. 4. Tag trocken	5. m.	5. a.
		3116	3007	2947	2920	2985	3014				
76	3352	3100	2985	2920	2937	3016	3042	3365	3. bis 4. Tag trocken	5. m.	4. a.
		3340	3241	3195	3232	3287	3305				
77	3330	3275	3217	3206	3270	3317	3342	3265	3. Tag trock.; 4. Tag kleiner Rest	6. m.	4. a.
		3270	3202	3170	3182	3224	3255				
78	3852	3224	3187	3195	3206	3236	3241	3735	2. Tag klein; 3. Tag ziemlich trocken	5. a.	5. m.
		3785	3716	3670	3660	3684	3710				
79	3250	3742	3696	3642	3691	3698	3724	3172	3. Tag klein; 5. Tag trocken	6. m.	5. m.
		3226	3173	3095	3084	3109	3121				
80	2685	3187	3128	3072	3112	3135	3140	2648	2. Tag klein; 3. Tag trocken	5. m.	4. a.
		2680	2555	2471	2561	2600	2625				
		2597	2517	2520	2600	2637	2634				

Lauf. Nummer	Gewicht der Kinder nach Tagen, morgens und abends								Beschaffenheit des Nabelschnurrestes	Tag, an welchem	
	geburts- tag	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		der Nabelschnur- rest abfiel	das Gewicht wieder stieg
81	3485	3418	3326	3260	3281	3297	3345	3347	3. Tag trocken	5. m.	5. m.
		3375	3304	3224	3280	3316	3324				
82	3210	3156	3071	3020	3052	3087	3110	3140	2. Tag klein; 3. Tag trocken	5. m.	4. m.
		3084	3005	3025	3061	3112	3125				
83	2927	2872	2815	2730	2772	2770	2841	2837	3. Tag trocken	4. m.	4. a.
		2844	2763	2764	2781	2816	2810				
84	3510	3492	3395	3372	3417	3506	3524	3572	2. Tag noch frisch; 3. Tag trocken	5. m.	4. m.
		3416	3341	3394	3494	3490	3548				
85	3551	3516	3412	3341	3360	3376	3397	3431	3. bis 4. Tag trocken	5. a.	4. a.
		3446	3387	3369	3364	3400	3435				
86	3646	3597	3526	3452	3495	3484	3515	3562	3. Tag etw. nässend; 4. Tag trocken	6. m.	5. m.
		3570	3495	3421	3476	3505	3527				
87	3466	3414	3365	3326	3348	3397	3465	3510	3. Tag trocken	4. a.	4. m.
		3387	3302	3365	3380	3424	3471				
88	2920	2892	2808	2844	2912	2974	3010	3026	2. Tag trock.; 3. Tag kleiner Rest	5. m.	3. a.
		2867	2815	2894	2937	2965	3005				
89	3074	3028	2976	2894	2975	2962	3006	2986	3. Tag trocken	4. m.	4. a.
		3002	2941	2900	2954	3000	3012				
90	3250	3196	3165	3161	3182	3200	3236	3268	3. Tag trocken	5. m.	4. m.
		3170	3102	3150	3210	3224	3224				

Lauf. Nummer	Gewicht der Kinder nach Tagen, morgens und abends								Beschaffenheit des Nabelschnurrestes	Tag, an welchem	
	Geburts- tag	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		der Nabelschnur- rest abfiel	das Gewicht wieder stieg
91	3030	3002	2924	2832	2801	2812	2860	2861	3. u. 4. Tag nässend; 5. Tag trocken	6. m.	6. m.
		2975	2887	2826	2782	2837	2842				
92	4500	4426	4342	4296	4330	4371	4416	4426	3. Tag trocken	4. m.	4. a.
		4377	4316	4315	4327	4404	4432				
93	3562	3518	3412	3354	3378	3384	3410	3430	3. Tag trocken; 4. Tag kleiner Rest	5. m.	4. a.
		3476	3398	3361	3390	3397	3405				
94	2566	2508	2458	2350	2330	2360	2394	2410	3. Tag noch frisch; 5. Tag trocken	7. m.	5. a.
		2492	2416	2339	2348	2362	2420				
95	3228	3197	3086	3042	3120	3181	3185	3215	2. Tag klein; 3. bis 4. Tag trocken	5. m.	4. a.
		3115	3070	3084	3172	3196	3210				
96	2740	2723	2591	2546	2584	2615	2667	2690	3. Tag trocken; 4. Tag kleiner Rest	6. m.	4. a.
		2675	2570	2550	2605	2643	2670				
97	3187	3150	3072	2947	2980	3035	3016	3036	3. Tag trocken	5. a.	5. m.
		3102	3026	2932	3030	3020	3025				
98	2950	2927	2847	2802	2824	2861	2886	2912	3. Tag trock.; 4. bis 5. Tag kleiner Rest	6. m.	4. m.
		2885	2796	2799	2840	2890	2892				
99	3020	2974	2892	2916	2985	3005	3030	3086	3. Tag trocken	4. a.	3. a.
		2940	2914	2945	3030	3042	3071				
100	2847	2790	2744	2755	2792	2805	2825	2847	3. Tag trocken	5. m.	5. m.
		2772	2711	2760	2790	2826	2830				

Lauf. Nummer	Gewicht der Kinder nach Tagen, morgens und abends								Beschaffenheit des Nabelschnurrestes	Tag, an welchem	
	Geburts- tag	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		der Nabelschnur- rest abfiel	das Gewicht wieder stieg
101	3560	3549	3470	3356	3362	3378	3412	3428	2. Tag klein; 3. Tag trocken; 4. Tag Nab. entzündet	4 m.	5. m.
		3496	3410	3341	3350	3395	3405				
102	3026	2968	2875	2832	2765	2800	2826	2845	3. Tag weich; 4. u. 5. Tag trocken	6. a.	5. a.
		2910	2850	2785	2805	2830	2845				
103	2900	2836	2794	2733	2694	2678	2748	2802	3. u. 4. Tag nässend; 5. Tag trocken	7. m.	6. a.
		2802	2746	2712	2678	2704	2794				
104	2784	2696	2614	2594	2600	2716	2742	2756	3. Tag trocken	5. m.	4. a.
		2670	2604	2607	2632	2707	2735				
105	3360	3296	3242	3185	3216	3300	3348	3412	3. Tag noch gross; 5. Tag trocken	6. m.	5. m.
		3284	4220	3170	3235	3326	3391				
106	2125	2894	2806	2734	2782	2807	2815	2835	3. Tag trock.; 4. Tag kleiner Rest	6. m.	4. a.
		2840	2760	2771	2780	2821	2833				
107	2852	2775	2746	2773	2771	2825	2842	2865	3. Tag trocken	5. m.	4. m.
		2770	2705	2760	2800	2812	2876				
108	3170	3115	3050	2965	2985	2992	3035	3052	3. bis 4. Tag trocken	5. m.	5. m.
		3082	2997	2942	2980	3030	3027				
109	3324	3294	3216	3154	3170	3206	3216	3220	3. Tag trock.; 4. Tag kleiner Rest	6. m.	4. a.
		3276	3188	3172	3183	3194	3225				
110	2784	2746	2684	2635	2675	2710	2728	2756	3. Tag trocken	5. a.	4. a.
		2720	2641	2664	2700	2705	2742				

Lauf. Nummer	Gewicht der Kinder nach Tagen, morgens und abends								Beschaffenheit des Nabelschnurrestes	Tag, an welchem	
	Geburts- tag	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		Nabelschnur- rest abfiel	das Gewicht wieder stieg
111	2872	2840	2752	2703	2734	2765	2812	2845	3. Tag trocken	5. m.	4. m.
		2775	2701	2720	2768	2800	2844				
112	3255	3217	3162	3097	3142	3147	3185	3190	3. Tag trock.; 4. Tag kleiner Rest	6. m.	4. a.
		3185	3106	3110	3150	3172	3177				
113	3100	3050	2986	2912	2940	2957	3006	3025	3. Tag trocken	5. a.	4. a.
		3014	2927	2944	2965	2981	3033				
114	3754	3718	3634	3614	3630	3685	3716	3728	3. Tag trocken	5. m.	4. m.
		3690	3600	3626	3682	3690	3705				
115	2910	2875	2804	2770	2730	2812	2855	2848	2. Tag klein u. weich; 3. Tag trocken	5. a.	5. a.
		2832	2786	2742	2768	2836	2842				
116	4206	4149	3968	3904	3982	4043	4112	4148	3. Tag trock.; 4. Tag kleiner Rest	6. m.	4. a.
		4116	3920	3970	4051	4100	4135				
117	3176	3122	3067	3002	2938	2917	2957	2981	3. u. 4. Tag nässend; 5. Tag trocken	7. m.	6. a.
		3096	3021	2965	2924	2902	2975				
118	3027	2976	2906	2847	2854	2876	2913	2943	3. Tag trocken	5. m.	5. m.
		2934	2891	2829	2850	2910	2920				
119	3170	3095	3026	2946	2953	3002	3010	3032	3. Tag trock.; 4. Tag kleiner Rest	5. m.	4. a.
		3051	2978	2964	2970	3010	3024				
120	3762	3721	3654	3602	3606	3599	3643	3656	3. Tag zur Hälfte trocken; 4. Tag unt. Sulze	6. m.	5. m.
		3638	3612	3570	3594	3622	3638				

Lauf. Nummer	Gewicht der Kinder nach Tagen, morgens und abends								Beschaffenheit des Nabelschnurrestes	Tag, an welchem	
	Geburts- tag	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		der Nabelschnur- rest aufiel	das Gewicht wieder stieg
121	3453	3421	3372	3314	3367	3372	3406	3414	3. Tag fast ganz trocken	4. a.	4. a.
		3403	3341	3356	3388	3391	3398				
122	3500	3478	3417	3376	3387	3416	3441	3453	2. Tag klein; 3. Tag trocken	5. m.	5. m.
		3466	3403	3342	3394	3408	3441				
123	3384	3342	3297	3250	3256	3300	3387	3404	3. Tag trocken	4. m.	4. a.
		3320	3261	3267	3273	3341	3390				
124	2809	2771	2685	2695	2735	2752	2780	2768	3. Tag trocken	4. m.	4. m.
		2710	2652	2713	2760	2771	2794				
125	2776	2722	2653	2580	2543	2561	2618	2623	3. u. 4. Tag nassend; 5. Tag kleiner trockener Rest	7. m.	6. m.
		2 392	2630	2565	2512	2556	2610				
126	2872	2860	2790	2780	2796	2812	2830	2824	3. Tag trocken	4. m.	4. m.
		2797	2763	2782	2788	2808	2816				
127	2908	2873	2830	2775	2813	2834	2848	2865	3. Tag trocken	4. a.	4. a.
		2846	2794	2791	2836	2852	2861				
128	3290	3270	3162	3127	3092	3112	3128	3144	3. Tag fast abgetrocknet; 4. Tag Nabel gerötet	4. m.	5. m.
		3231	3135	3065	3063	3095	3116				
129	2762	2716	2664	2547	2568	2573	2606	2623	2. Tag nassend; 3. u. 4. Tag trockener Rest	6. m.	5. a.
		2695	2552	2514	2567	2599	2600				
130	3635	3597	3551	3560	3569	3577	3628	3645	2. Tag trocken; 3. u. 4. Tag kleiner Rest	5. m.	3. a.
		3570	3567	3548	3582	3612	3617				

Lebenslauf.

Ich, Max Götzl, bin geboren am 13. Juli 1879 zu Westerholzhausen (Obb.) als Sohn des Lehrers Mathias Götzl. Nach der Volksschule besuchte ich das Gymnasium Freising und das Ludwigs-Gymnasium in München, erhielt dort am 14. Juli 1899 das Zeugnis der Reife. Sodann besuchte ich die kgl. Ludwig-Maximilians-Universität zu München, bestand im März 1902 das Tentamen physicum und am 5. Juli 1904 das medizinische Staatsexamen.
